

Национальный календарь профилактических прививок

Против вирусного гепатита В ребенка начинают прививать в роддоме. Очень важно получить прививку в это время для исключения возможности инфицирования от матери. Вторую прививку ребенок получает в 3 месяца, третью в 6 месяцев. Прививка обязательна также всем взрослым в возрасте до 55 лет, не болевшим ранее.

Против туберкулеза прививку ребенку делают также в роддоме, повторную (ревакцинацию) - в 6-7 и 14 лет. В месте введения вакцины через 4-6 недель возникает небольшое уплотнение и покраснение, через 6-12 месяцев образуется рубчик. Перед ревакцинацией, чтобы убедиться, что организм ребенка свободен от микобактерий туберкулеза делают внутрикожную пробу - реакцию Манту. И, если она отрицательна, проводят ревакцинацию.

Против полиомиелита ребенок впервые получает вакцину в возрасте 3 месяцев, а затем еще два раза с интервалами в полтора месяца. Ревакцинацию проводят в 18 и 20 месяцев и в 14 лет.

Иммунизация против коклюша, дифтерии и столбняка начинается также в 3 месяца одновременно с введением полиомиелитной вакцины. Вторая и третья прививки проводятся в 4,5 и 6 месяцев. Первую ревакцинацию проводят в 1,5 года. На этом прививка против коклюша завершается. Иммунизацию против дифтерии и столбняка продолжают препаратом АДС-М- анатоксином. Вторую ревакцинацию проводят в 6-7 лет, третью в 14 лет. В дальнейшем ревакцинация проводится всем взрослым каждые 10 лет до конца жизни.

Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи проводится детям в 1 год, ревакцинация в 6 лет. Иммунизация против кори обязательна всем взрослым до 35 лет, а в Республике Бурятия группам риска независимо от возраста. Против краснухи 2 прививки должны получить все женщины в возрасте до 25 лет.

Прививка против пневмококковой инфекции была включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2014г. Вакцинация проводится в 2 и 4,5 месяца, ревакцинация - в 15 месяцев. Данная прививка проводится с целью профилактики внебольничных пневмоний, гнойного менингита, отита.

Иммунизация против гемофильной инфекции проводится детям из группы риска - с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям, находящимся в домах ребенка.

Иммунизация против гриппа проводится ежегодно перед эпидсезоном заболеваемости гриппом (в сентябре-октябре) детям с 6-месячного возраста, учащимся 1 - 11 классов, студентам высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др., взрослым старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, призывникам.